

Tabla 6. Escala de Wood-Downes modificada por Ferrés				
	0	1	2	3
Sibilancias	No	Final espiración	Toda la espiración	Inspiración + espiración
Tiraje	No	Subcostal/ Intercostal inferior	“1” + supraclavicular + aleteonasal	“2” + intercostal inferior + supraesternal
FR	<30	31-45	46-60	>60
FC	<120	>120		
Entrada aire	Buena	Regular, simétrica	Muy disminuida Simétrica	Tórax silente Ausencia sibilancias
Cianosis	No	Si		

Crisis leve: 1-3 puntos; crisis moderada: 4-7 puntos; crisis grave: 8-14 puntos.

Tabla7. Factores relacionados con riesgo de muerte por asma
Ingreso en UCI Pediátrica en los 12 meses previos
Función pulmonar basal (PEF < 70% del previsto)
Asma con agudizaciones graves de inicio y/o empeoramiento brusco
Asma moderada o grave asociada a patología crónica grave (malformaciones, enfermedad cardiorespiratoria o neurológica)
Asma dependiente de corticoides orales
Necesidad de dosis altas de corticoides inhalados
Tres o más ingresos en el hospital por asma en los doce últimos meses
Asma con agudizaciones moderadas y graves que cumple al menos uno de los siguientes criterios: <ul style="list-style-type: none"> - pobre percepción de los síntomas por parte del niño y/o la familia - mal cumplimiento del tratamiento de control - disfuncionalidad familiar - retraso en el inicio del tratamiento con β_2, mala técnica o negativa a usarlos - negación de la enfermedad y/o rechazo al tratamiento y seguimiento del asma - uso abusivo e indiscriminado de agonistas β_2